

【临床研究】

康复新液治疗消化性溃疡 202 例临床研究

吕丹杨¹ 陈军贤² 刘海燕² 夏亮² 钟燕敏² 赵秋枫² 姒健敏¹

1 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 浙江 杭州 310016

2 浙江省立同德医院 浙江 杭州 310012

摘要 目的：研究康复新液治疗消化性溃疡的临床疗效。方法：将胃阴虚证型的消化性溃疡 268 例，随机分为治疗组 202 例，对照组 66 例。治疗组给予中成药康复新液口服，每次 10ml，每日 3 次；对照组给予西药法莫替丁片，每次 20mg，每日 2 次。两组均治疗 4 周为 1 疗程。结果：两组治疗后各症状积分和总积分均明显低于治疗前 ($P < 0.01$)，治疗组治疗后的各症状积分和总积分，与对照组比较无统计学意义 ($P > 0.05$)，两组的总有效率及胃镜疗效比较相仿，无统计学意义 ($P > 0.05$)。结论：康复新液治疗胃阴虚证型的消化性溃疡的疗效与法莫替丁片相似，具有良好的治疗作用。

表 1 两组治疗前后各症状积分和总积分变化 ($\bar{x} \pm s$)

症状	治疗组 (n=202)		对照组 (n=66)	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
胃脘疼痛	3.94±1.33	0.69±0.99	3.64±1.35	0.85±1.27
胃脘灼热	3.58±1.44	1.10±1.08	3.64±1.48	1.28±1.10
饥不欲食	3.51±1.59	0.70±1.12	3.50±1.36	0.83±1.24
口干舌燥	1.45±0.67	0.35±0.51	1.41±0.60	0.45±0.66
手足心热	1.53±0.71	0.40±0.56	1.35±0.71	0.52±0.66
大便干结	1.53±0.69	0.48±0.57	1.32±0.89	0.40±0.54
暖气吞酸	2.06±0.76	0.55±0.62	1.88±0.73	0.64±0.61
总积分	15.87±4.92	3.79±3.28	14.86±4.72	4.35±3.51

表 1 示, 两组治疗后各症状积分和总积分均明显低于治疗前 ($P < 0.01$), 而治疗后两组间各症状积分和总积分比较无显著性差异 ($P > 0.05$)。表明西药在

改善临床症状方面均有显著作用。

4.2 两组中医证候疗效比较, 见表 2。